

心不全患者さんを 診られている先生方へ 【心不全治療】 サムスカ 導入入院のしおり



院長 森 弥生
ご連絡先：医療相談室
03-3934-1611

◆心不全における利尿薬

心不全の浮腫(うっ血所見)治療には、利尿薬が用いられます。既存の利尿薬は電解質排泄を伴いますが、腎集合管に働き、水のみを排泄させる、水利尿薬(サムスカ)の使用経験が増えております。サムスカは、高い利尿効果、血行動態に影響が少なく、腎機能悪化抑制、再入院の抑制等の特徴があります。但し、入院下で処方開始できる薬剤であり、少し高価な薬剤になります。(サムスカ7.5mg：3割負担 383.19円/日、1割負担 127.73円/日)

◆下記4項目の内、いずれかに該当する場合はご紹介ください。

心不全の基本治療(塩分制限・利尿剤投与・RAS系阻害剤投与・β遮断薬投与等)を行っているにも関わらず、**体液量のコントロールが困難な患者さん**

心不全の基本治療中で、**下記利尿薬用量より多く投与されている患者さん**
『ラシックス20mg・ダイアート30mg・ルプラック4mg』

心不全の基本治療中で、**徐々に腎機能の低下が見られる患者さん**
『血清クレアチニン値(sCr) > 1.3mg/dL』

心不全の基本治療中で、**血清ナトリウム値が135mEq/L未満の患者さん**

◆概ね1～2週間程度の入院を予定しております。

お仕事のご都合等により、入院期間についてもご相談して決めていきたいと思っております。

| 入院日数 | 検査等 | サムスカ服薬 |
|------|--|-----------|
| 1日目 | ・血圧、採血、採尿 ・胸部レントゲン ・心電図 ・投与薬剤チェック | — |
| 2日目 | ・血圧、採血、採尿 ・生活・栄養指導 | ○ 服薬開始 |
| 3日目 | | ○ |
| 4日目 | 採血等 必要に応じた検査 | ○ |
| 5日目 | | ○ |
| 6日目 | | ○ |
| 退院日 | ・血圧、採血、採尿 ・退院後の生活指導 | サムスカ継続服薬 |